TL17. VALIDACIÓN DE CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL GRUPO INTERNACIONAL DE HEPATITIS AUTOINMUNE: REPORTE DE 116 PACIENTES CON PRESENTACIÓN AGUDA

***Pizarro C**, Poniachik R, Pavez C, Brahm J, Poniachik J. Sección de Gastroenterología, Hospital Clínico Universidad de Chile. Santiago, Chile.*

Introducción: La hepatitis autoinmune de presentación aguda (HAI- pAg), es un desafio diagnostico, ya que con frecuencia no presenta las caracteristicas típicas de la hepatitis autoinmune. El Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune ha propuesto un sistema comprensivo de criterios diagnosticos para ser aplicado en estudios clínicos, y uno simplificado para ser utilizado en la práctica diaria. Estos criterios no han sido validados en los pacientes con HAIpAg. **Objetivos**: Establecer la utilidad del *score* original y simplificado pre tratamiento en el diagnóstico y por subgrupos. **Métodos:** Estudio retrospectivo, 116 pacientes con diagnóstico de HAIpAg, todos con estudio histológico controlados en un centro. Se definieron tres subgrupos, 1. HAIpAg sin criterios de gravedad, n = 74, 2. HAIpAg grave (protrombina < 50%), n 32 y 3. HAIpAg fulminante (protrombina < 50% y encefalopatía), n =10. Se aplicaron ambos scores, con análisis de sensibilidad. **Resultados:** Al utilizar el *score* original 113 pacientes se diagnosticaron como HAI definitiva o probable, sensibilidad 97%, mientras que al aplicar el simplificado 97 pacientes se diagnosticaron como HAI definitiva o probable, sensibilidad 83%. La sensibilidad del *score* original fue 97% para el grupo 1 y 2 y 100% para el grupo 3, mientras que para el simplificado fue 87, 84 y 83% respectivamente. **Conclusión:** En los pacientes con HAIpAg el *score* original y el simplificado son útiles para su diagnóstico siendo más sensible el *score* original, permitiendo el diagnóstico en una alta proporción de los pacientes.