# TL19. USO Y PRESCRIPCIÓN DE INHIBIDORES DE LA SECRECIÓN ÁCIDA EN UN HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD

***Sánchez G***[1], *Ferrada A*[2], *Vásquez E*[3], [1]*Académico Escuela de Química y Farmacia Universidad de Valparaíso. Valparaíso, Chile.* [2]*Servicio de Gastroenterología Hospital Dr. Eduardo Pereira. Valparaíso, Chile.* [3]*Alum- no Tesista Escuela de Química y Farmacia Universidad de Valparaíso. Valparaíso, Chile.*

**Introducción:** Los inhibidores de la secreción ácida (ISA) son fármacos muy utilizados en el ámbito intrahospitalario. Se describe hasta un 65% de uso no justificado de estos medicamentos en pacientes hospitalizados, que pueden generar la aparición de reacciones adversas, y además aumento en los costos en salud. **Objetivos:** Describir la prescripción de ISA de pacientes institucionalizados en el servicio de medicina interna del Hospital Dr. Eduardo Pereira (HEP). **Metodología:** Estudio clínico prospectivo, longitudinal, con muestreo no probabilístico en el servicio de medicina interna del HEP en entre mayo y agosto del 2018 y que recibieron algún tipo ISA. Se analizaron variables demográficas competentes al estudio, tipo de ISA, indicación y dosis. Además, se realizó una encuesta para determinar si los pacientes presentaban otras indicaciones de uso de medicamentos no documentadas en ficha clínica como dispepsia y reflujo gastroesofágico (RGE). **Resultados:** En resultados preliminares, de 532 pacientes ingresadas al servicio, 211 (39,66%) recibieron algún tipo de ISA. De estos, 70 (33,2%) por hemorragia digestiva alta (HDA), 46 (21,8%) no tenía justificación de uso descrita en la literatura, 39 (18,5%) por RGE y 56 (26,5%) por otras causas. **Conclusiones:** Se observó que la principal indicación de uso de ISA en pacientes hospitalizado fue la HDA seguida en forma interesante de causa no justificada, que no deja de ser importante por el riesgo potencial de efectos adversos. El porcentaje de uso no justificado menor a trabajos similar se atribuyo a uso de encuesta para evitar sesgos.