TL 2. ENFERMEDAD HEPÁTICA POR HÍGADO GRASO. PRINCIPAL CAUSA DE CIRROSIS EN PACIENTES CON HEPATOCARCINOMA EN DOS HOSPITALES DE SANTIAGO DE CHILE

***Martínez R*[1]*, *Carvajal R*[1]*, *Roblero JP*[1], *Henriquez V*[2]*, *Torres F*[2]*, *Arave- na E*[1], *Castro L*[1], *Urzúa A*[2], *González K*[2], *Poniachik J*[2], *Iracheta A*[2]. [1]*Gas- troenterología Hospital Clínico San Borja Arriarán, Universidad de Chile. Santiago, Chile. [2]*Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Santiago, Chile. *Becado de Gastroenterología, Universidad de Chile.*

Introducción: El hepatocarcinoma (HCC) es una de las principales causas de muerte en cirróticos. Hay un aumento en la enfermedad por hígado graso no alcohólico (EHGNA) en pacientes con HCC. Datos sobre prevalencia y factores de riesgo para HCC en Chile es escasa. **Objetivos:** Determinar la etiología de cirrosis en pacientes con HCC entre los años 2000 y 2018 en dos hospitales de Santiago. Objetivos secundarios se evalúan las características del tumor y el estadio al diagnóstico. **Método:** Estudio observacional, descriptivo. Analizamos registros de 288 pacientes diagnosticados entre los años 2000-2009 y 2010-2018. El estadío según clasificación de Barcelona (BCLC). **Resultados:** Edad promedio 65,5 ± 10,4 años; 66% hombres; 22% de los pacientes tenía Diabetes Mellitus. La principal etiología de cirrosis fue EHGNA (38,8%), virus C (25,8%) y enfermedad hepática por alcohol (21%). Al comparar los períodos 2000-2009 y 2010- 2018 se observa un incremento en la EHGNA (p: 0,003) y disminución en la enfermedad por alcohol (p: 0,005). No hubo cambios en la prevalencia del virus C. Hubo disminución en la proporción de pacientes diagnosticados en estadios avanzados (C y D), p: < 0,001, en el período 2010-2018; un aumento del estadio intermedio (B), p: 0,03 y no se observaron cambios en el diagnóstico en estadios tempranos (0 y A). **Conclusión:** La EHGNA como causa de cirrosis en pacientes con HCC ha aumentado significativamente. El porcentaje de pacientes diagnosticados en estadios avanzados ha disminuído, no así el diagnóstico en estadios tempranos.