TL32. RESERVORIO ILEAL POR COLITIS ULCEROSA: RESULTADOS, EVALUACIÓN FUNCIONAL Y CALIDAD DE VIDA EN EL SEGUIMIENTO SOBRE 10 AÑOS

Carcamo L[1], *Miranda P*[1], *Grasset E*[1], *Zúñiga A*[1], *Molina ME*[1], *Urrejola G*[1], *Larach T*[1], *Miguieles R*[1], *Bellolio F*[1]. [1]*Unidad de Coloproctología, División de Cirugía Digestiva, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.*

Introducción: La proctocolectomía con reservorio ileoanal (RIA) es el procedimiento de elección para el tratamiento quirúrgico de la colitis ulcerosa (CU). Es importante evaluar la preservación, los resultados funcionales y complicaciones de ellos a largo plazo. **Objetivo:** Evaluar la preservación, morbilidad, resultados funcionales, calidad de vida y satisfacción de los pacientes sometidos a RIA por CU con más de 10 años de evolución. **Material y Método:** Estudio de cohorte no concurrente. Se identificaron todos los pacientes sometidos a RIA por CU entre 1984-2007, tratados en nuestra institución. Se recolectaron variables demográficas, quirúrgicas y morbilidad. Se efectuó una encuesta via e-mail incluyendo la escala funcional de Öresland, calidad de vida de Cleveland y grado de satisfacción con la cirugía a largo plazo. Estadística analítica, uso de regresión logistica y curvas de Kaplan-Meier. Significancia $p < 0,05$. **Resultados:** 116 pacientes incluidos. Sesenta y siete (57,8%) fueron mujeres, edad 35 ± 10,3 años al momento de intervención. Ciento doce (96,5%) de los RIA se confeccionaron en J y 85 (73,2%) en 3 etapas. Presentaron morbilidad precoz y a largo plazo 16,4 y 59,9% de la serie respectivamente. Mediana de seguimiento 20 (10-34) años. A los 20 años, 93.1% mantenía un RIA funcionante. 55 pacientes respondieron encuesta. La mediana funcional fue 6 (1-15) y la calidad de vida global de 0,8 (0,23-1). Un 92,7% se encuentra satisfecho con su cirugía. **Conclusión:** Los RIA por CU presentan una excelente tasa de conservación a largo plazo, con resultados funcionales aceptables y buena calidad de vida.