TL40. UTILIDAD DE MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN PREVENCIÓN DE RETENCIÓN DE VIDEOCÁPSULA ENDOSCÓPICA EN PACIENTES CON PATOLOGÍA DE INTESTINO DELGADO

Díaz C[1*], *Gompertz M*[1], *Gil L*[1]. [1]*Sección de Gastroenterología, Departamento de Medicina Interna, Hospital Clínico Universidad de Chile. Santiago, Chile. *Becada.*

Introducción: La cápsula endoscópica (CE) es un examen útil en el diagnóstico de patologías del intestino delgado (ID), su principal complicación es la retención. La causa más común de retención es la presencia de estenosis del ID, en pacientes con factores de riesgo es útil evaluar previamente la permeabilidad del tubo digestivo mediante diferentes métodos. **Objetivos:** Evaluar la utilidad de métodos predictivos de retención en pacientes con indicación de CE. **Métodos:** Estudio observacional descriptivo de 68 pacientes a quienes se les solicitó CE. Se realizó encuesta sobre uso de AINES, cirugías, dolor abdominal recurrente, antecedente de obstrucción intestinal y Enfermedad de Crohn (EC). **Resultados:** 68 pacientes, 56% hombres, edad promedio 55 (20 -90) años. Siete (10,2%) tenían factores de riesgo clínico y/o imagenológico de retención de CE, en 3 destacaba la presencia de dilatación de asas de ID en escáner de abdomen y pelvis. En estos 7 pacientes se administró cápsula PATENCY (CP), 2 de ellos no expulsaron el dispositivo evidenciándose la presencia del marcador radiopaco en ID mediante radiografía de abdomen simple, contraindicando el uso de CE; en uno de ellos se concluyó EC y en el otro estenosis yeyunal por mesenteritis retráctil. Un paciente con escáner de abdomen normal presentó retención de la CE a nivel de una estenosis ulcerada, el estudio posterior con enteroscopia y biopsias diagnosticó EC. **Conclusiones:** En nuestra casuística se confirma la utilidad de la CP como un método eficaz para evaluar el riesgo de retención de CE en pacientes con factores de riesgo de estenosis de ID.

Trabajos Libres Orales Tema: Hígado