TL41. PREVALENCIA DE HEPATITIS B EN PACIENTES CON VIH

Mousqués N[1], *Dutra A*[2], *Rodríguez M*[3], *Gagliano G*[4], *González V*[5], *Pereira M6. [1]Médico del Servicio de Enfermedades Infecto Contagiosas. Montevideo, Uruguay. [2]Médico Infectólogo de Sociedad Privada Española, Montevideo, Uruguay. Médico Infectólogo de Círculo Católico, Montevideo, Uruguay. [4]Médico Epidemiólogo del Hospital Central de las FFAA. Montevideo, Uruguay. [5]Médico Pediatra del Hospital Pereira Roussel. Montevideo. Uruguay. [6]Médico Infectologo de Asociación Española. Montevideo, Uruguay. En nombre de Grupo de estudio Uruguayo en VIH (GeUVIH), Montevideo, Uruguay.*

Introducción: Mundialmente la coinfección VIH y VHB tiene alta prevalencia (7,4%). Esta coinfección facilita altos niveles de replicación, disminuye la tasa de resolución espontánea y presenta un mayor riesgo de reactivación y complicaciones. **Objetivo:** Conocer la prevalencia de la coinfección del VIH y hepatitis B (VHB) y las características de esta población. **Métodos:** Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de historias clínicas de pacientes con VIH, que firmaron consentimiento, de diferentes servicios donde trabajan los autores. Se usó formulario electrónico y tabla dinámica de Excel. Se consideró paciente con VHB aquellos con anti core positivo, antígeno de superficie y/o antígeno “e” y/o anticuerpo “e” y/o carga viral VHB + Variables: edad, sexo, orientación sexual, factores de riesgo, carga viral (CV) VIH, CV VHB, tratamiento y evolución. **Resultados:** De 247 historias revisadas, 13 están coinfectados. Una mujer y 12 hombres. Rango de edad 18-61 años. De ellos 7 son HSH y el resto heterosexual. Promiscuos son 7 pacientes, de ellos 2 son trabajadores sexuales. CV - VIH indetectable en 10 pacientes, 3 restantes se diagnosticaron este año y están detectables. Todos los pacientes están tratados para VHB con Lamivudina, Tenofovir y tienen CV indetectable 4 de ellos. **Conclusión:** La prevalencia de la coinfección VIH/VHB es baja como refiere la literatura, aunque, si bien esta es una muestra pequeña, la prevalencia es aún menor a la referida por la OMS. Se requieren más estudios para establecer la prevalencia real de la coinfección en nuestro medio.