TL44. EXPERIENCIA DE TRATAMIENTO DE VIRUS DE HEPATITIS C (VHC) CON ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA (AAD) EN UN HOSPITAL PÚBLICO

Leal G[1], *Retamal M*[1], *Jirón MI*[2], *Mezzano G*[2], *Goméz F*[2]. [1]*Becados.* [2]*Ser- vicio de Gastroenterología, Hospital del Salvador, Universidad de Chile. Santiago, Chile.*

Introducción: La infección VHC es un problema sanitario a nivel mundial. La disponibilidad en últimos años de los AAD es un avance importante en el tratamiento de VHC debido a la alta tasa de curación. **Objetivo:** Evaluar la respuesta a tratamiento anti VHC con AAD en pacientes con Infección por VHC entre junio de 2016 a agosto de 2018, tratados durante 12 semanas, a las 4, 12 y 24 semanas desde el inicio del tratamiento denominada como respuesta viral sostenida (RVS). **Métodos:** De 197 pacientes en control en un Hospital Terciario, 38 pacientes (66% hombres), edad (61 ± 19 años), genotipo predominante 1b (50%), fueron tratados con AAD: Sofosbuvir-Ledipasvir, Sofosbuvir-Velpatasvir, Sofosbuvir-Daclastavir y Dasabuvir-Ritonavir-Parataprevir-Ombitasvir. Se priorizó a pacientes con cirrosis (73,6%), trasplantados hepáticos (23,6%), falla de terapia (26,3%), hemofílicos (11%), Coinfección VIH-VHC (2,6%) y hemodiálisis (2,6%). Se analizó con carga viral a las 4, 12 y RVS a 24 semanas de inicio de tratamiento según AAD. Se realizó análisis estadístico porcentual. **Resultados:** De los 38 pacientes tratados, 36 lo completaron (1 abandono y 1 fallecimiento). El 78% utilizó AAD originales y 22% terapias genéricas. La carga viral fue negativa en un 41% a 4 semanas y en un 91,6% a las 12 semanas, a la RVS fue de 100%. Los efectos adversos más comunes fueron cefalea (27%) y anemia (11%). **Conclusiones:** La alta respuesta a tratamientos con AAD fue similar a la demostrada en la literatura, independiente del tipo de AAD recibido. Los efectos adversos fueron mínimos.