TL55. ACTUALIZACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA ENFERMEDAD CELÍACA DEL ADULTO

***Madrid AM**, Fernández R, Vera DB. Sección de Gastroenterología, Departamento de Medicina Interna, Hospital Clínico Universidad de Chile. Santiago, Chile.*

Introducción: En la última década se ha descrito incremento de la enfermedad celíaca (EC). Actualmente, hay escasos reportes sobre características clínicas de EC en adultos. **Objetivo:** Describir características clínicas y síntomas en adultos con EC. **Métodos:** Estudio retrospectivo de celíacos controlados. En todos se evaluaron datos demográficos, síntomas, comor- bilidades, estudio endoscópico e histológico. **Resultados:** Se registraron 154 adultos con EC en control, edad 47 (18-86) años, 79% sexo femenino. El 13% antecedente familiar de primer grado de EC. En 62% el diagnóstico fue después de los 40 años, (10% mayor de 60), sin diferencia por sexo. Según índice de masa corporal (IMC), 5,8% bajo peso, 55,8% normopeso, 28,8% sobrepeso y 9,6% con obesidad. Un 10% tenía esteatohepatitis y/o daño hepático y 36% otra patología autoinmune (hipotiroidismo 15% en mujeres). Los síntomas que motivaron la consulta fueron dispepsia en 48% de las mujeres y 28% de los hombres (p = 0,04), diarrea (47% *vs* 69%; p = 0,02), anemia (30% *vs* 19%) y fatiga (23% *vs* 31%) sin diferencias. En la endoscopia se observó un 25% atrofia vellositaria y el estudio histológico 83% etapa Marsh 3. Se detectó cáncer al momento del diagnóstico en 7 mujeres. **Conclusión:** La EC del adulto actualmente se presenta en pacientes con sobrepeso y obesidad, en mujeres adultas mayores y se asoció a patologías autoinmunes y esteatohepatitis. El compromiso histológico es severo y el cáncer asociado puede ser una complicación por la demora en el diagnóstico de EC.