TL57. MANOMETRÍA ANORRECTAL DE ALTA RESOLUCIÓN 3D: DATOS DEMOGRÁFICOS Y CLÍNICOS DE PACIENTES CHILENOS

Saavedra J[1], *Domínguez L*[2], *Morales E*[3]. [1]*Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile.* [2]*Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.* [3]*Departamento Gastroenterología, Clínica Las Condes. Santiago, Chile.*

Introducción: La manometría anorrectal de alta resolución 3D es un procedimiento que ayuda a precisar el diagnóstico de desórdenes de la función anorrectal, tales como constipación crónica (CC) refractaria e incontinencia fecal (IF). **Objetivos:** Realizar un estudio epidemiológico descriptivo de 79 manometrías rectales de alta resolución 3D en pacientes sintomáticos, realizadas entre los años 2016-2017, según protocolo validado por la Sociedad Europea de Neurogastroenterología. **Métodos:** Los pacientes sintomáticos fueron estratificados por edad y sexo. Para clasificar a los pacientes con IF y CC se ocuparon los cuestionarios de Wexner y Kess respectivamente. **Resultados:** Se incluyeron 79 personas con un promedio de edad de 44 años, dentro de los cuales 86% fueron mujeres y 14% hombres. De los pacientes constipados 11% fueron normales; 18% presentó defectos defecatorios tipo disinergia con 2 criterios; 15% hipertonía del esfínter anal interno (EAI); 8% hipertonía del esfínter anal externo (EAE) y el resto presentó otros defectos. De los pacientes con IF sólo un 1% obtuvo resultados normales; un 10% presentó disinergia; un 16% presentó hipotonía del EAI; un 11% hipotonía del EAE y el resto hipotonía de ambos esfínteres. **Conclusión:** De acuerdo a los resultados del estudio, la patología mayormente encontrada en CC fue defecto defecatorio tipo disinergia, mientras que la minoría de los pacientes con IF tiene resultados normales, presentando en su mayoría hipotonía de uno o ambos esfínteres. Esta es la primera serie nacional de pacientes con manometría ano- rrectal de alta resolución 3D.