TL70. NUEVA TÉCNICA DE GASTROPEXIA ASISTIDA POR ENDOSCOPIA DE BAJO COSTO EN LA GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA

Sequera J[1], *Carrasco R*[2]. [1]*Jefe Departamento de Cirugía y Endoscopia Hospital de Quellón. Chiloé, Chile.* [2]*Jefe Servicio de Endoscopia, Hospital de Puerto Montt. Puerto Montt, Chile.*

Introducción: La Gastrostomía Endoscópica Percutánea (GEP), es actualmente la técnica de elección, debido a su seguridad y menor invasividad. La complicación más grave asociadas a este procedimiento es: Peritonitis difusa asociada a la extravasación del contenido gástrico hacia la cavidad abdominal por retiro prematuro de la sonda de gastrostomía. Este riesgo disminuye considerablemente si se realiza la gastropexia, que se define como la fijación del estómago, hacia la pared abdominal, esto se realiza con poca frecuencia debido al costo del instrumento diseñado para tal fin. Para evitar complicaciones graves asociadas a la GEP, hemos desarrollado una técnica de gastropexia percutánea guiada por endoscopia, segura, de bajo costo y de fácil ejecución, empleando insumos médicos básicos. **Objetivo:** El propósito de este estudio es demostrar la utilidad de esta técnica en la prevención de complicaciones graves de GEP. **Método:** Esta técnica se implementó en las unidades de endoscopia del Hospital de Quellón (Chiloé) y Hospital de Puerto Montt durante el período comprendido entre enero y septiembre del año 2018 en 20 pacientes con edades comprendidas entre 30 y 78 años, con trastornos de la deglución. **Resultados:** Se realizo con éxito gastropexia por vía percutánea en 20 pacientes, observando ausencia de complicaciones graves asociadas al retiro prematuro de la sonda de gastrostomía. **Conclusión:** Esta técnica de gastropexia percutánea dirigida por endoscopia, representa una alternativa útil, en la prevención de complicaciones graves asociadas a la GEP.